

DERMALIBOUR+ CICA-Gel moussant

Évaluation de la tolérance
et de l'efficacité subjective du gel
moussant DERMALIBOUR+ CICA sur
la zone intime externe chez des sujets
présentant une infection intime traitée

LABORATOIRE
A-DERMA

DERMALIBOUR+



1
pays



33
sujets

48 % Femmes
 52 % Hommes

Objectifs de l'étude

Évaluer la tolérance dermatologique,
gynécologique et vénérienne et l'ef-
ficacité subjective de DERMALIBOUR+
CICA-Gel moussant en association
avec un traitement après 10 jours
d'utilisation quotidienne



**3 consultations médicales
espacées de 5 jours**

EN ASSOCIATION AVEC
UN TRAITEMENT MÉDICAL



DERMALIBOUR+ CICA-GEL
MOUSSANT SUR L'ENSEMBLE
DU CORPS, Y COMPRIS
LA ZONE INTIME EXTERNE

■ EFFICACITÉ

Sensation apaisante
perçue pour

88 %
des sujets

■ EFFICACITÉ

Produit donnant
satisfaction pour

94 %¹
des sujets

■ TOLÉRANCE

Les médecins,
jugent la tolérance
« très bonne »
aux niveaux cutané
et gynécologique /
vénéréologique